Ansprechpartner Rebschutz

Cordier hanna.cordier@dlr.rlp.de
Lentes eric.lentes@dlr.rlp.de
Scholtes markus.scholtes@dlr.rlp.de
Seidel peter.seidel@dlr.rlp.de

Ansprechpartner Weinbau

Dreis kira.dreis@dlr.rlp.de
Hermes christopher.hermes@dlr.rlp.de
Regnery daniel.regnery@dlr.rlp.de

www.dlr.mosel.rlp.de

**REBSCHUTZMITTEILUNG
MOSEL UND AHR 2025**

Nr. 18

16.07.2025

**- FRÜHE SORTEN BEGINNEN ZU FÄRZEN -
- WARTEZEIT -
- BOTRYTIS-PRÄVENTION -**

Aktuelle Lage:

Bernkastel-Kues

Plasmopara Oidium Schwarzfäule **Phänologie** Schwarzholz Kräuselmilbe Traubenwickler Wetter

Übersicht Grafik Huglin-Index Blattwachstum

Daten seit: 2020 Entwicklung Blattfläche Grafik aktualisieren

VitiMeteo

Rebwachstumsmodell: Algorithmen nach Prof. Dr. H. Schultz, Hochschule Geisenheim University.

In der vergangenen Woche kam es vereinzelt zu Hagel, der punktuell auch Beeren verletzt hat. Diese trocknen ein und es sind zum jetzigen Zeitpunkt keine gesonderten Maßnahmen zu ergreifen. Insgesamt kam es aber zu keinen größeren Schäden.

Früh Sorten beginnen zu färben – ein Indikator für den aktuellen Entwicklungsstand der Phänologie der Rebe, vergleichbar mit den vorangegangenen frühen Jahrgängen. Wir bewegen uns in großen Schritten bei allen weiteren Rebsorten hin zur Veraison. Je nach Produktionsziel (Traubensaft, Sektgrundwein) muss unbedingt das Augenmerk auf die Wartezeiten der verschiedenen Pflanzenschutzmittel gelegt werden, ob diese noch aufgrund längerer Wartezeiten einsetzbar sind. Ausserdem muss individuell entschieden werden, wie viele weitere Pflanzenschutzmaßnahmen überhaupt noch durchgeführt werden sollten. Peronospora ist im gesamten Dienstbezirk nur vereinzelt im Gipfellaub/Neuzwachs vorzufinden, wenn überhaupt. Oidium findet man hingegen mehr oder weniger flächig.

Diejenigen, bei denen keinerlei Befall vorzufinden ist, haben bis dato die beste Botrytisprävention getan. Dort, wo vereinzelt Befälle vorzufinden sind, besteht je nach Witterung zur Reifephase die Gefahr, dass hier Botrytis ansetzt. Als weitaus bessere Fäulnisvorsorge im direkten Vergleich zu Spezialbotrytiziden, hat sich in den letzten Jahren der mehrmalige Einsatz von Bicarbonaten bewährt. Die Wasserversorgung der Anlagen lässt einen öfteren Einsatz in der Saison 2025 im Vergleich zu trockengestressten Anlagen der Vorjahre wesentlich besser vertreten.

Die Mittel und die passende Aufwandmenge können Sie unserer [Liste](#) oder auf der Homepage unter Aktuelles (<https://www.dlr-mosel.rlp.de/DLR-Mosel/Aktuelles/Ueberblick>) entnehmen.

Schwarzholzkrankheit:

Die Winden-Glasflügelzikade kann die Erreger der Schwarzholzkrankheit von der Ackerwinde, Zaunwinde oder der Brennessel auf die Reben übertragen. Fehlt es an Wirtspflanzen, suchen die Zikaden bei Nahrungssuche Reben auf und führen zu entsprechenden Infektionen. Es empfiehlt sich ab sofort bis Ende Juli, das Abmähen/Mulchen der Winden und Brennesseln zu unterlassen.

Bernkastel-Kues, 16.07.2025

*Team Rebschutz und Weinbau
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel*

Alle Bilder: ©Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Mosel

Weitere Informationen zu Weinbau und Oenologie finden Sie auch auf unserer Homepage www.dlr-mosel.rlp.de oder auf der Homepage der Agrarverwaltung Rheinland-Pfalz unter www.dlr.rlp.de.

Newsletter-Abmeldung

[Hier](#) können Sie sich schnell und unkompliziert abmelden.